

AMOXICILLINE  
**Enfant ≤ 12 kg**

Nom Prénom  
Poids

- 1) Amoxicilline suspension buvable :  
donner .... mg 2 fois par jour pendant 5 jours  
Soit .... cuillère(s) mesure 2 fois par jour pendant 5 jours
- 2) En situation de pénurie de la suspension buvable :  
amoxicilline 1000 mg comprimé dispersible et sécable  
... mg d'amoxicilline à donner 2 fois par jour pendant 5 jours

Seringue de 10 ml : 1

Coupe comprimé : 1 (si comprimé non sécable)

Dilution de 500 mg d'amoxicilline (= un demi comprimé de 1000 mg)  
dans 10 ml d'eau (solution 50 mg/mL)  
Entourer la bonne posologie

Si utilisation d'un comprimé dilué, jeter la solution diluée non prise

Garder la moitié du comprimé non utilisée pour la prise suivante


Poids de l'enfant	Posologie 100 mg/kg/j d'amoxicilline
	Dose unitaire
4-6 kg	250 mg = 5 mL
6-8 kg	375 mg = 7.5 mL
8-12 kg	500 mg = 10 mL

# Dilution des comprimés d'amoxicilline 1g dispersibles en l'absence des formes buvables Enfant < 12 kg

N'utiliser que la **moitié d'un comprimé** à chaque prise  
et conserver l'autre moitié pour la prise suivante



Prélever **10 mL** d'eau



Prélever ..... **mL** du mélange,  
soit ..... **mg** et donner le contenu  
de la seringue à votre enfant



Mettre la **moitié d'un  
comprimé** d'amoxicilline 1 g  
dans un verre et y ajouter les  
**10 mL** d'eau



Bien mélanger jusqu'à ce  
que le **médicament soit  
complètement dissout**



Jeter le reste du mélange dans la  
poubelle et rincer la seringue et le  
verre utilisé à l'eau chaude